

WHAT IS SYPHILIS?



Syphilis is a type of infection that spreads through sex. It starts with a small sore around private parts or in the mouth. Even if you don't see any sores, you can still spread it to others. There are other infections like chlamydia and gonorrhea that can look like syphilis, but they are caused by different bacteria and may require other testing and/or treatment.

HOW COMMON IS SYPHILIS?



In 2019, there were 129,813 new cases of syphilis reported in the United States. This is a rate of 39.6 cases per 100,000 population.

HOW IS SYPHILIS SPREAD?



You can get syphilis by direct contact with a syphilis sore during vaginal, anal, or oral sex. Syphilis sores can be found on or around the penis, vagina, anus, rectum, lips or in the mouth.

You cannot get syphilis through casual contact with objects such as toilet seats, doorknobs, swimming pools, hot tubs, bathtubs, shared clothing or eating utensils.

HOW CAN I REDUCE MY RISK?

Risk of syphilis results from unprotected sexual contact with one or multiple partners who is/are currently infected with syphilis. It is possible for a person to be infected with syphilis without having symptoms (i.e., "asymptomatic") and still transmit the infection to another. If you are sexually active, doing the following can lower your chances of getting syphilis:

- Being in a long-term, mutually monogamous relationship with a partner who has been tested and has negative STI test results
- Using latex condoms the right way every time you have sex.
- Ask your partner if he or she has ever had an STI. It may be awkward, but it's important to have an honest discussion with your partner. People with a history of STIs have a higher risk of infection.

HOW DO I KNOW IF I HAVE SYPHILIS?



Syphilis symptoms can be hard to notice and come and go over time. The best way to know if you have syphilis is to get tested. You may not notice symptoms, or you may mistake them for another skin condition such as a pimple or rash. Syphilis occurs in stages:

- **Primary Stage:** A syphilis sore shows up where the infection entered your body. This is usually on or around your vagina, penis, scrotum, or anus. In rare situations syphilis can appear on your lips or mouth. These sores are very contagious and show up between 3 weeks and 3 months after infection. These sores usually last 3 to 6 weeks and then go away on their own.
- **Secondary Stage:** Symptoms include rashes on the palms of your hands, soles of your feet or other parts of your body. This rash may be hard to see, and it usually doesn't itch. You may have flu-like symptoms. This can last 2 to 6 weeks at a time and may come and go for up to 2 years. These symptoms will go away by themselves, but until you get treated for syphilis, you'll still have the infection and it can move into the dangerous later stages.
- **Late Stage:** In between the secondary stage and the late stage, there may be times when your syphilis infection is latent (there are no signs or symptoms at all) for months or even years – but you still need treatment to get rid of it. People who have had syphilis for a long time face serious health problems. Late stages of syphilis can cause tumors, blindness, and paralysis. It can damage your nervous system, brain and other organs, and may even kill you.

Syphilis can be cured with antibiotics in the early stages. If you get treatment late, it will still cure the infection and stop future damage to your body. But the damage that late stage syphilis has already caused can't be changed or healed. The complications from late stage syphilis can happen 10-20 years after you first get infected.

READY TO TAKE THE TEST? CONSIDER THIS.



You might have some concerns about your sexual health and what your test result will be. This is normal. By making the decision to learn about your syphilis status you have taken a giant step **toward taking control of your future and protecting your health.**

You should know that it can take some time for the test to detect syphilis in your body. This time period can vary from person to person. This time period is commonly referred to as the "window period".

FIRST
TO **Know**[®]

Syphilis - Be The First To Know[®]

EDUCATIONAL GUIDE

For In Vitro Diagnostic Use
For Over the Counter (OTC) Use

EG-8057
Rev. 1.0

THE WINDOW PERIOD

As with many tests, there is a possibility of a false negative result. It can take **10 to 90 days** after being exposed to syphilis for the symptoms to appear. If your test result is negative, but you think you are positive:

- **Retake the test after symptoms appear OR**
- **Retake the test within 90 days after possible exposure. Try to avoid sexual contact during this time.**

This will help reduce the possibility of a false negative result.



WHAT IF YOUR TEST IS POSITIVE?

If your test is positive, contact your healthcare provider to confirm your First To Know[®] Syphilis Test result.

Syphilis can be cured with the right antibiotics. However, treatment will not undo any damage that the infection has already caused.

After you have received appropriate treatment, syphilis will not recur on its own. However, you can become re-infected if you have sexual contact with someone with syphilis.



I'M PREGNANT. CAN MY BABY GET SYPHILIS?

Syphilis infection can be passed from you to your unborn child and may cause miscarriage, pre-mature birth or a potentially deadly infection called congenital syphilis. If infected babies are not treated quickly, they can become developmentally delayed, have seizures or die.

If you are pregnant, it's important to see a healthcare provider right away for routine prenatal care. As part of your prenatal care visits, you will be screened for STIs including syphilis. If you test positive for syphilis, you can be treated during your pregnancy to lower the chances of passing the infection to your unborn child.



WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?

Learning that you may have syphilis can be stressful. Remember that you are not alone! Many people and organizations in communities around the world are ready, willing, and able to help you. The key is to ask for help as soon as possible.


Visit our website at www.firsttoknow.com for help locating counseling and care.



QUESTIONS?

Call us toll-free at 1-844-207-3370 if you have questions about:

- Whether the test is right for you
- How to use the test
- How to read your result
- What to do if you are not sure of your result
- What to do once you have your result
- How to find healthcare providers for additional testing or treatment options

 **All calls are completely confidential.**

VISIT OUR WEBSITE FOR HELP

Go to firsttoknow.com for more information on:

- Syphilis
- Product information
- Product use video
- Where to buy
- Educational resources
- Help locating counseling and care



¿QUÉ ES LA SÍFILIS?



La sífilis es un tipo de infección que se transmite a través de las relaciones sexuales. Comienza con una pequeña llaga alrededor de las partes íntimas o en la boca, pero, aun cuando no vea una llaga, puede contagiar a otras personas. Existen otras infecciones, como la clamidia y la gonorrea, que pueden parecerse a la sífilis, pero que son causadas por bacterias diferentes y pueden requerir otras pruebas o tratamientos.

¿QUÉ TAN COMÚN ES LA SÍFILIS?



En 2019, se informaron 129,813 casos nuevos de sífilis en los Estados Unidos. Se trata de una tasa de 39.6 casos por cada 100,000 habitantes.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA SÍFILIS?



La sífilis se puede contraer por contacto directo con una llaga sifilítica durante el sexo vaginal, anal u oral. Las llagas de la sífilis pueden encontrarse en el pene, la vagina, el ano, el recto, los labios, la boca, o en sus alrededores.

No se puede contraer sífilis a través del contacto casual con objetos como el inodoro, asientos, pomos de puertas, piscinas, jacuzzis, bañeras, ropa compartida o utensilios para comer.

¿CÓMO PUEDO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIARME?

El riesgo de contraer sífilis proviene del contacto sexual sin protección con una o varias personas que tengan sífilis. Una persona puede tener sífilis sin presentar síntomas (es decir, ser "asintomática") y, aun así, transmitir la infección a otros. Si tiene una vida sexual activa, hacer lo siguiente puede reducir sus probabilidades de contraer sífilis:

- Estar en una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que se haya sometido a pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS) y haya obtenido resultados negativos.
- Usar preservativos de látex de forma correcta cada vez que tenga relaciones sexuales.
- Preguntarle a su pareja si alguna vez tuvo una ITS. Puede que sea incómodo, pero es importante que tenga una conversación sincera con su pareja. Las personas con antecedentes de ITS tienen un mayor riesgo de infección.

¿CÓMO SÉ SI TENGO SÍFILIS?



Los síntomas de la sífilis pueden ser difíciles de detectar y aparecen y desaparecen con el tiempo. La mejor manera de saber si tiene sífilis es hacerse la prueba. Es posible que no note los síntomas o que los confunda con otra afección de la piel, como un grano o un sarpullido. La sífilis se presenta en etapas:

- **Etapas primarias:** Aparece una llaga de la sífilis en el lugar por donde la infección entró en el organismo. Los lugares más comunes suelen ser la vagina, el pene, el escroto o el ano, o alrededor de esas zonas. En pocas ocasiones, la sífilis puede producirse en los labios o la boca. Estas llagas son muy contagiosas y aparecen entre 3 semanas y 3 meses después de la infección. Suelen durar de 3 a 6 semanas y luego desaparecen por sí solas.
- **Etapas secundarias:** Entre los síntomas se incluye el sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies u otras partes del cuerpo. El sarpullido puede ser difícil de ver y, en general, no pica. Es posible que tenga síntomas parecidos a los de la gripe. Los síntomas pueden durar de 2 a 6 semanas por cada episodio y aparecer y desaparecer durante hasta 2 años. Estos síntomas desaparecerán por sí solos, pero, hasta que reciba tratamiento para la sífilis, seguirá teniendo la infección, que puede alcanzar una etapa más avanzada y peligrosa.
- **Etapas avanzadas:** Entre la etapa secundaria y la etapa avanzada, puede haber momentos en que la infección por sífilis esté latente (que no haya signos ni síntomas en absoluto) durante meses o incluso años, pero, aun así, necesitará tratamiento para curarse. Las personas que han tenido sífilis durante mucho tiempo enfrentan graves problemas de salud. Las etapas avanzadas de la sífilis pueden causar tumores, ceguera y parálisis. También pueden producir daños en el sistema nervioso, el cerebro y otros órganos, e incluso causar la muerte.

La sífilis se puede curar con antibióticos en las primeras etapas. Además, aunque reciba el tratamiento tarde, la infección se curará y eso impedirá daños posteriores en el cuerpo. Sin embargo, el daño ya causado por la sífilis avanzada no se puede curar ni revertir. Las complicaciones de la sífilis avanzada pueden ocurrir de 10 a 20 años después de la primera infección.

¿DECIDIÓ HACERSE LA PRUEBA? CONSIDERE ESTO.



Es posible que tenga algunas inquietudes sobre su salud sexual y sobre cuál será el resultado de la prueba. Esto es normal. Al tomar la decisión de saber si tiene sífilis o no, ha dado un paso gigantesco **para tomar el control de su futuro y proteger su salud.**

Sepa que es posible que haya que esperar un tiempo antes de que se pueda detectar la presencia de sífilis en el organismo con la prueba. Este período, que puede variar según la persona, se llama comúnmente "período ventana".

FIRST
TO **Know**[®]

Sífilis: First To Know[®]

GUÍA EDUCATIVA

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso de venta libre

EG-8057
Rev. 1.0

EL PERÍODO DE VENTANA

Como ocurre con muchas pruebas, existe la posibilidad de un resultado falso negativo. Los síntomas pueden tardar entre **10 y 90 días** en aparecer después de haber estado expuesto a la sífilis. Si el resultado de la prueba es negativo, pero cree que debería ser positivo:

- **vuelva a realizar la prueba después de que aparezcan los síntomas; 0**
- **vuelva a realizar la prueba en los 90 días posteriores a la posible exposición. Intente evitar el contacto sexual durante este tiempo.**



Esto ayudará a reducir la posibilidad de un resultado falso negativo.

¿QUÉ PASA SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA DA POSITIVO?

Si el resultado de la prueba da positivo, comuníquese con su proveedor de atención médica para confirmar el resultado de la prueba de sífilis First To Know[®].

La sífilis puede curarse con los antibióticos adecuados. Sin embargo, el tratamiento no deshace ningún daño que la infección ya haya causado.

Después de haber recibido el tratamiento adecuado, la sífilis no volverá a aparecer por sí sola. Sin embargo, puede volver a infectarse si tiene contacto sexual con alguien que tiene sífilis.



ESTOY EMBARAZADA. ¿MI BEBÉ PUEDE CONTRAER SÍFILIS?

La infección por sífilis puede transmitirse a su hijo por nacer y puede ocasionar un aborto espontáneo, un parto prematuro o una infección potencialmente mortal llamada sífilis congénita. Si los bebés infectados no reciben tratamiento rápidamente, pueden sufrir retrasos en el desarrollo, convulsiones o la muerte.

Si está embarazada, es importante consultar a un proveedor de atención médica de inmediato para recibir la atención prenatal de rutina. Como parte de sus consultas de atención prenatal, se le realizarán pruebas de detección de ITS, incluida la sífilis. Si el resultado de la prueba de sífilis es positivo, puede recibir tratamiento durante el embarazo para reducir las probabilidades de transmitir la infección al feto.



¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Enterarse de que podría tener sífilis puede ser estresante. Recuerde que hay gente dispuesta a brindarle su apoyo. Muchas personas y organizaciones en comunidades de todo el mundo están dispuestas a brindarle ayuda y pueden hacerlo. La clave es pedir ayuda lo antes posible.


Visite nuestro sitio web www.firsttoknow.com para obtener ayuda para buscar asesoramiento y atención.



¿TIENE PREGUNTAS?

Llámenos sin cargo al 1-844-207-3370 si tiene preguntas sobre lo siguiente:

- Si la prueba es adecuada para usted.
- Cómo utilizar la prueba.
- Cómo comprender el resultado.
- Qué hacer si no confía en el resultado.
- Qué hacer una vez que tenga el resultado.
- Cómo encontrar proveedores de atención médica para realizar pruebas adicionales o tratamientos.

 **Todas las llamadas son completamente confidenciales.**

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER AYUDA

Visite firsttoknow.com para obtener más información:

- Sífilis
- Información del producto
- Video de uso del producto
- Dónde comprarlo
- Recursos educativos
- Ayuda para buscar asesoramiento y atención

